

Το **BioDEC Liquid** βρίσκεται σε υγρή μορφή. Περιέχει ωφέλιμους μικροοργανισμούς που βρίσκονται φυσiolογικά στο περιβάλλον σε συγκέντρωση 1×10^{12} cfu/L (cfu: αριθμός αποικιών). Οι μικροοργανισμοί βρίσκονται μέσα στο προϊόν σε βιολογικά ανεργή κατάσταση. Μετά τη διάλυση του προϊόντος σε νερό οι μικροοργανισμοί ενεργοποιούνται και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Οι μικροοργανισμοί έχουν τη δυνατότητα αποδόμησης φυτικών ιστών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υπολείμματα Καλλιέργειών (ενσωμάτωση στο έδαφος): Μετά τη συγκομιδή, κόβουμε τα υπολείμματα των καλλιεργειών μερικώς (με αλωνιστική μηχανή) ή ολικώς (με καταστροφέα), και στη συνέχεια διαλύουμε το **BioDEC Liquid** στη συστηνόμενη δοσολογία και εφαρμόζουμε με ψεκασμό σε όλη την έκταση. Ακολουθώς ενσωματώνουμε με άροση τις οργανικές ύλες στο έδαφος σε βάθος 30-50cm. Η ενσωμάτωση των υπολειμμάτων θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2-4 μήνες πριν τη φύτευση-σπορά ή την εφαρμογή των λιπασμάτων της επόμενης καλλιεργείας.

Υπολείμματα Καλλιέργειών (χωρίς ενσωμάτωση στο έδαφος): Μετά τη συγκομιδή, κόβουμε τα υπολείμματα των καλλιεργειών μερικώς (με αλωνιστική μηχανή) ή ολικώς (με καταστροφέα). Εναλλακτικά ψεκάζουμε με ζιζανιοκτόνο. Στη συνέχεια διαλύουμε το **BioDEC Liquid** στη συστηνόμενη δοσολογία και εφαρμόζουμε με ψεκασμό σε όλη την έκταση. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνει με αρκετή ποσότητα νερού και ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε να επιτευχθεί πολύ καλή διαβροχή των υπολειμμάτων. Η εφαρμογή του **BioDEC Liquid** πρέπει να γίνει τουλάχιστον 3-5 μήνες πριν τη φύτευση-σπορά ή την εφαρμογή των λιπασμάτων της επόμενης καλλιεργείας.

Υπολείμματα Δενδροκαλλιέργειών (φύλλα, κλαδέματα κ.α.): Τεμαχίζουμε τα υπολείμματα της δενδροκαλλιέργειας είτε με θρυμματιστή είτε με καταστροφέα και στη συνέχεια διαλύουμε το **BioDEC Liquid** στη συστηνόμενη δοσολογία και εφαρμόζουμε με ψεκασμό σε όλη την έκταση. Στη συνέχεια είτε αφήνουμε την οργανική ύλη επιφανειακά είτε την ενσωματώνουμε στο έδαφος. Γεωργικά Απόβλητα: Μετά τη συγκομιδή, ξεριζώνουμε την καλλιέργεια και απομακρύνουμε τα γεωργικά απόβλητα σχηματίζοντας σωρούς. Στη συνέχεια διαβρέχουμε τους σωρούς των γεωργικών αποβλήτων με διάλυμα **BioDEC Liquid** κατάλληλης αναλογίας και ανακατεύουμε καλά μέχρι να επιτύχουμε άριστη διαβροχή των αποβλήτων.

Ακολουθώς σκεπάζουμε τους σωρούς με κάλυμμα και τους αφήνουμε για τουλάχιστον 2-4 μήνες. Στο διάστημα αυτό τα υπολείμματα των σωρών θα πρέπει να διαβρέχονται με νερό και να ανακατεύονται ανά τακτά διαστήματα ώστε να διατηρούνται τα επίπεδα της απαιτούμενης υγρασίας. Η διαδικασία ευνοείται σε συνθήκες θερμοκρασίας $>15-20^{\circ}\text{C}$. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου τα επεξεργασμένα απόβλητα επιστρέφουν στον αγρό, απλώνονται σε όλη της έκταση και ενσωματώνονται στο έδαφος με άροση σε βάθος 30-50cm. Τα επεξεργασμένα υπολείμματα δε θα πρέπει να τοποθετούνται σε επαφή με λιπάσματα.

Μικροβιακή Διάσπαση Γεωργικών Αποβλήτων & Υπολειμμάτων Καλλιέργειών

BioDEC Liquid



CERTIFIED
ORGANIC

Πρωτεολυτικά και κυτταρολυτικά βακτήρια που προάγουν την κομποστοποίηση

Δεν περιέχει παθογένηις & γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς.

Καθ. Περιεχόμενο:

1L

Παραγωγή - Διάρθρωση

HUMOFERT



Ερμού 13 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση

T: 210 284 5891 - F: 210 281 7971

E: info@humofert.gr W: www.humofert.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Διαλύουμε σε κατάλληλο όγκο νερού προκειμένου να εξασφαλιστεί καλή διαβροχή των υπολειμμάτων. Στο διάλυμα είναι καλό να προστεθεί 1 kg μελάσα ανά 1000 λίτρα νερό για γρηγορότερο ζύπνισμα των μικροοργανισμών. Αναδεύουμε καλά και ψεκάζουμε σε όλη την επιφάνεια των υπολειμμάτων της καλλιεργείας.

Υπολείμματα ψυχανθών, ζωοτροφών: 0,5-1L ανά 10 στρέμματα

Υπολείμματα δημητριακών, ρυζιού, καλαμποκιού: 0,5-1L ανά 10 στρέμματα

Υπολείμματα καρπών, βαμβάκιου: 0,5-1L ανά 10 στρέμματα

Υπολείμματα αρωματικών, ενεργειακών καλλιέργειών: 0,5-1L ανά 10 στρέμματα

Υπολείμματα λαχανικών, κηπευτικών: 0,5-1L ανά 10 στρέμματα

Υπολείμματα Δενδροκαλλιέργειών (φύλλα, κλαδέματα κ.α.): 0,5-1L ανά 10 στρέμματα

Γεωργικά απόβλητα: 0,5-1L ανά 10 στρέμματα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με βακτηριοκτόνα, μυκητοκτόνα και λιπάσματα. Μπορεί να συνδυαστεί με ζιζανιοκτόνα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. Διατηρείστε το προϊόν καλά κλεισμένο στην αρχική του συσκευασία. Σε περίπτωση που ανοίξετε το προϊόν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε άμεσα, διαφορετικά φυλάξτε το στο ψυγείο (4°C) καλά κλεισμένο. Μετά τη χρήση μην αφήνετε το κατάκι ανοιχτό. Το προϊόν έχει χρόνο ζωής 6-8 μήνες σε συνθήκες δωματίου και 1-1,5 χρόνο στους 4°C από την ημερομηνία παραγωγής του. Κρατήστε το μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς και οποιαδήποτε τηγνή θερμότητας. Τα άδεια μπουκάλια δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Αν πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα πλύνετε καλά το δέρμα σας με σαπούνι και νερό. Αν πέσει στα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Παρασκευάσμα ωφέλιμων
μικροοργανισμών σε υγρή μορφή

Βιοδιεγέρτης φυτών –
Παρασκευάσμα ωφέλιμων
μικροοργανισμών (Π VII)
Πρόϊον του Παραρτήματος Π VII (α/α 6)
της αρ. 50424/10-03-2025 (ΦΕΚ Β'
1074) Υ.Α.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη
βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ)
2018/848 (ΕΕ L 150) και 2021/1165 (ΕΕ L 253),
όπως κάθε φορά ισχύουν.»



5 212024 534767